

■ 검사 전 유의사항

1. 복용중인 약물은 담당의사와 상담 하십시오.
(감기약, 한약, 두드러기약, 알레르기비염약, 항히스타민제는 검사 3일전부터 복용 금지)
2. 혈압약, 당뇨약, 영양제등은 그대로 복용하셔도 됩니다.
3. 식사는 가능합니다.
4. 처방되는 약은 검사 시 사용하므로 미리 사용 금지.
5. 주치의 상담에 의해 필요하다고 판단되는 경우, 검사 약물을 직접 준비하여 가져오실 수도 있습니다.
6. 유발 검사에 의한 심한 전신 반응 발생시, 경과 관찰, 안정 및 치료를 위한 추가적인 시간이 소요될 수 있습니다.

■ 검사 소요 시간 : 약 1시간

▶ 검사 장소

* 1층 페센터 외래

● 경구 약물 유발검사

약물 이상 반응을 보인 환자에게서 원인되는 약물을 찾기위해 의심되는 약물을 직접 복용해서 동일한 반응이 나타나는지를 확인하는 검사 입니다.

■ 검사 전 유의사항

1. 복용중인 약물은 담당의사와 상담 하십시오.
(감기약, 한약, 두드러기약, 알레르기비염약, 항히스타민제는 검사 3일전부터 복용 금지)
2. 혈압약, 당뇨약, 영양제등은 그대로 복용하셔도 됩니다.

3. 처방되는 약은 검사 시 사용하므로 미리 사용 금지.
4. 주치의 상담에 의해 필요하다고 판단되는 경우, 검사 약물을 직접 준비하여 가져오실 수도 있습니다.
5. 검사 당일은 금식하고 오십시오.(생수는 가능)
6. 검사 시작 8시간전에는 벤토린 등 기관지 확장제 사용금지.
7. 유발 검사에 의한 심한 전신 반응 발생시, 경과 관찰, 안정 및 치료를 위해 응급실 방문이 필요 할 수 있으며, 이 경우 응급실 진료에 따른 추가 비용 및 시간이 발생할 수 있습니다.

■ 검사 소요 시간 : 6~8시간

▶ 검사 장소

* 1층 페센터 외래

● 알레르기 첩포 검사

알레르기 질환의 원인을 규명하기 위해 등 또는 팔에 알레르기 원인 물질을 부착하고 알레르기 반응 정도를 보는 검사 입니다.

■ 검사 전 유의사항

1. 복용중인 약물은 담당의사와 상담 하십시오.
(감기약, 한약, 두드러기약, 알레르기비염약, 항히스타민제는 검사 3일전부터 복용 금지)
2. 혈압약, 당뇨약, 영양제등은 그대로 복용하셔도 됩니다.
3. 식사는 가능하며, 주치의 상담에 의해 필요 하다고 판단되는 경우, 검사 물질/약물을 직접 가져오실 수도 있습니다.

4. 등에 검사 할 수 있으므로 상/하의 분리된 옷을 입고 오시고, 샤워 후 몸에 오일/바디 로션등은 바르지 마십시오.

■ 검사 소요 시간 : 검사 당일엔 첩포 제작 및 부착까지 약 2시간 이내의 시간이 소요됩니다. 이후 경과 관찰을 위한 48시간/72시간째 방문 시에는 첩포 부위 반응 관찰을 위한 1시간 이내 의 시간이 소요됩니다.

▶ 검사 장소

* 1층 페센터 외래

■ 검사 후 유의사항

☞ 검사 경과 관찰을 위해 반드시 검사 후 48시간, 72시간에 내원 하셔야 하며, 검사부위를 긁거나 만지면 안됩니다. 경과 관찰 끝날때까지(3~4일간) 물이 닿으면 안되므로 샤워나 목욕을 하지 못합니다.

❖ 검사 시작 후 종료까지 4~10 시간이 소요될 수 있으나, 검사 시작 시간을 반드시 준수해주시시오.

(문의사항)

-페센터 외래 : **1588-3369**

-폐기능, 알레르기검사실 : 031-787-3270~1

■ 1층 안내도



■ 2층 안내도



SNUH 분당서울대학교병원

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY BUNDANG HOSPITAL

463-707 경기도 성남시 분당구 구미로 173번길 82

진료예약 **1588-3369**

www.snubh.org

검사안내서

특수검사부

알레르기 검사

